

قطع عضو



مددجوی گرامی مطالب فوق به منظور آشنایی شما با حادثه قطع عضو طراحی شده است شایسته است با مطالعه این مطلب دوره درمان خود را به خوبی مدیریت کنید.

قطع عضو چیست؟

حذف یک اندام به دنبال تصادف یا جراحی قطع عضو نام دارد.

چه عواملی باعث انجام قطع عضو میشود؟

1. ضربه‌های شدید به اندام‌ها در تصادفات سنگین.
2. خون‌رسانی ناکافی به اندام و از بین رفتن آن به دنبال آسیب عروقی.
3. عفونت‌های شدید که قابل کنترل نیستند.
4. تومورهای اندام تحتانی.
5. سوختگی‌های شدید یا سرمازدگی شدید.
6. زخم‌هایی که بهبود نمی‌یابند و جان بیمار را به خطر می‌اندازند مثل زخم‌های دیابتی.
7. از دست دادن عملکرد اندام‌ها.
8. کاهش حس اندام که آن را مستعد جراحی می‌کند.

عوارض احتمالی

1. ممکن است باعث ایجاد لخته در پا و ایجاد مشکلات تنفسی یا ورم اندام شود.

2. خونریزی .

3. درد در رابطه با عضو قطع شده که نوعی درد خیالی است.

4. به علت اینکه قطع عضو انجام‌شده، دامنه حرکتی کاهش یافته و این باعث دردهای مفصلی می‌شود.

5. عفونت پوست یا استخوان زخم عضو قطع شده که بهبودی کامل نمی‌یابد.

قبل از جراحی

1. مصرف هرگونه داروی مکمل گیاهان دارویی با داروهای بدون نسخه را به پزشک اطلاع دهید.
2. در صورتیکه الکل زیاد می‌نوشید به پزشک اطلاع دهید.
3. چند روز قبل از عمل باید طبق دستور پزشک داروهایی مثل آسپرین، بروفن، وارفارین و سایر داروی ضدانعقاد خود را قطع کنید.
4. سیگار کشیدن را قطع کنید زیرا بهبودی را به تاخیر می‌اندازد و خون‌رسانی به بافت‌های بدن را کم می‌کند.
5. اگر دیابت دارید رژیم خود و داروهایتان را به درستی رعایت کنید.
6. تا روز عمل ۱۲-۸ ساعت قبل از عمل ناشتا باشید.
7. اگر دارویی را باید مصرف کنید با مقدار کمی آب استفاده نمائید. (با نظر پزشک معالج)

آماده شدن در منزل قبل از جراحی

1. برای نیازهای بعد از عمل در منزل برنامه ریزی کنید
2. از افراد خانواده، دوست و... جهت کمک کردن به شما در منزل، بعد از عمل هماهنگ کنید یا از واحدهای مراقبت در منزل کمک بگیرید.
3. وضعیت حمام، اتاق استراحت و... را قبل از عمل در نظر بگیرید. مثلاً از نصب میله در سرویس بهداشتی و حمام جهت حفظ تعادل اطمینان حاصل کنید که ایمنی شما در داخل و خارج از منزل فراهم است.

بعد از جراحی

1. محل جراحی شده دارای پانسمان است. شما ممکن است چند روز درد داشته باشید. برای تسکین درد مسکن تجویز شده است
2. ممکن است در محل عمل لوله‌هایی (درن) در محل زخم داشته باشید. (جهت خروج ترشحات)

قبل از خروج از بیمارستان باید این نکات را یاد بگیرید

1. نحوه استفاده از ویلچر و واکر
2. کشش‌های عضلانی را جهت قوی شدن عضلات انجام دهید.
3. بازوها و پاهایتان را قوی تر کنید با تمرین‌های ورزشی در اطراف تخت و سپس در اتاق و بیمارستان راه بروید.

به کمک همراه راه بروید



1. در حالت‌های مختلف بنشینید یا دراز بکشید.

2. از ثابت ماندن پرهیز کنید.

3. وزن را روی پای سالم بیندازید و تا زمانی که پزشک اجازه نداده‌اند وزن خود را روی عضو جراحی شده نیندازید.

نتیجه عمل به چه عواملی بستگی دارد؟

بهبودی شما و توانمندی شما بعد از عمل به عوامل زیادی بستگی دارد. بعضی از آنها عبارتند از علت قطع عضو، وجود دیابت، افت خون‌رسانی به اندام‌ها و خیلی از افراد می‌توانند زندگی خوبی بعد از قطع عضو داشته باشند. بعضی از افراد دچار افسردگی بعد از عمل می‌شوند و بسیار مهم است که در این رابطه با پزشک صحبت کنید.

مراقبت از محل جراحی

هنگامی که می‌نشینید محل عمل خود را بر روی یک سطح صاف قرار دهید.

هنگامی که نشسته‌اید پاهای خود را روی هم نیندازید زیرا خون‌رسانی کم می‌شود.

علائم خطر برای مراجعه به پزشک معالج در

بیمارستان

- اگر محل عمل قرمز باشد یا در لمس گرم‌تر باشد.
- وجود تورم در محل عمل

- وجود ترشحات یا خونریزی در محل عمل

- در صورتیکه محل زخم باز شده باشد و یا اینکه پوست ناحیه از هم فاصله بگیرد.

- تیره‌شدن یا سیاه‌شدن اطراف محل زخم

- درد غیر قابل کنترل با مسکن

- بوی بد از محل زخم

- تب بالای ۳۸ درجه

تهیه کنندگان:

مهدی عسکری تبار (کارشناس پرستاری)

نرگس سادات حسینی (کارشناس پرستاری)

تایید کننده علمی :

دکتر رضا پور علی (متخصص ارتوپدی و مدیر گروه ارتوپدی شهرستان

نیشابور)

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی

حکیم

نیشابور، میدان امام رضا (میدان باغرود)

۰۵۱۴۳۳۰۳۰۰۰

www.Hakim.Nums.ac.ir

Hakim_Nums

