



## فاویسم



واحد آموزش به بیمار بیمارستان  
حکیم  
تحت نظارت واحد EDO

11. داروهای زیر در افراد فاویسمی ممنوعیت مصرف دارند:

- آسپرین (ASA)
- نیتروفورانتوئین
- فورازولیدون
- نیتروفورازون
- کوتریموکسازول
- مفناید
- سیلورسولفادیازین
- سولفاسالازین
- تریپل سولفا
- ویتامین ث
- ویتامین کا
- دیفن هیدرامین
- کلروکین
- نالیدیکسیک اسید
- کلرامفنیکول
- سولفاستامید



7. فرد فاویسمی نمی تواند و نباید خون خود را اهدا نماید.
8. هرچند خطر بروز عارضه فاویسم پس از 10 سالگی کاهش می یابد اما بهتر است همیشه مراقب او باشید.
9. در اتاق یا محل زندگی افراد فاویسمی نباید از اسپری های حشره کش استفاده شود.
10. علائم حمله فاویسم به صورت تب، تهوع، استفراغ، سرگیجه و بی حالی، زردی و پررنگ شدن ادرار به رنگ چای و یا گاهی به رنگ خون و کم شدن میزان ادراری می باشد. در این گونه موارد به کودکان مایعات شیرین و بی رنگ مانند آب بسیار و یا آب انگور بدهید و به درمانگاه یا بیمارستان مراجعه کنید.

منابع: [www.uptodate.com](http://www.uptodate.com)

در صورت سؤال یا مشکل با شماره 43303362 واحد آموزش بیمارستان حکیم تماس حاصل فرمایید



## والدين گرامي:

كودك شما مبتلا به بيماري فاويسيسم است كه علت آن كمبود يا نقص آنزيمي در گلبول هاي قرمز به نام (G6PD) مي باشد. بروز اين بيماري با باقلا و بعضي داروهاي مصرف شده و يا عفونت هايي مثل بيماري هاي تب دار ارتباط دارد.

## علائم بيماري:

وقتي كودك شما در معرض بعضي از داروها كه بعدا نام

برده خواهد شد قرار گرفت و يابه بعضي عفونت ها

مبتلا شود ويا باقلا به هر شكل (خام يا پخته) مصرف

نمايد، 24 تا 48 ساعت و بعضي اوقات 5 تا 24 ساعت


پس از تماس علايم به شكل تب، تهوع، استفراغ، دل

درد، اسهال، تيره رنگ شدن ادرار، رنگ پريديگي، سرگيجه،

كاهش ادرار، تپش قلب نمايان مي شود. در صورت

مشاهده علائم فوق كودك خود را به نزديك ترين مركز

درماني برسانيد.



## لطفا به نکات آموزشی زیر توجه فرمائید:

1. رژیم غذایی كودك شما عادي است جز اينكه مصرف

باقلا به هيچ شكل (خام يا پخته، تازه، خشك شده يا

يخ زده) مجاز نيست و تا حد امکان از تماس كودك با

پوست باقلا خودداري كنيد حتي كودك خود را به

مزارع باقلا هم نبريد.

2. اگر به كودك فاويسيسمي خود شير مي دهيد شما هم بايد

از مصرف باقلا خودداري كنيد و اگر حتي يك دانه همم

مصرف نموديد بايد تا سه روز شير مادر را قطع نماييد. به

هيچ عنوان از داروي آسپيرين استفاده نكنيد و در مورد

خوردن هر دارويي نيز با پزشك مشورت كنيد



3. در صورت بروز نشانه هاي رنگ پريديگي شديد همراه تب و استفراغ كودك را با آب ولرم تن شويه كنيد از شيفاف استامينوفن استفاده و به اولين مركز درماني مراجعه نماييد.

4. هيچ دارويي را بدون نظر پزشك به كودكتان ندهيد و در صورت مراجعه به پزشك حتما به وي بگوويد كودكتان فاويسيسمي است.

5. فرزند شما بايد از خوردن سبزيجات زياد و بيش از حد معمول پرهيز كند.

6. براي بيد زايي لباسها از نفتالين استفاده نكنيد.

