

عفونت زخم جراحی چیست ؟

عمل جراحی از طریق ایجاد یک برش یا شکاف در پوست انجام می شود. برش ایجاد شده به کمک یک چاقوی کوچک جراحی منجر به ایجاد زخم جراحی می شود که در گذر زمان این زخم ممکن است عفونی شود و **عفونت زخم جراحی** به دنبال آن به وجود بیاید. در بسیاری از موارد عفونت های زخم جراحی در ۳۰ روز اول بعد از جراحی به وجود می آید. از اصلی ترین علائم عفونت زخم ثب است و در پی آن ترشح چرکی، التهاب و دردناک شدن زخم نمایان می شود.

علت به وجود آمدن عفونت زخم جراحی

عفونت زخم جراحی ممکن است به دلایل زیر رخ دهد:

- میکروب ها و باکتری هایی که به صورت طبیعی روی پوست قرار دارد و وارد زخم جراحی می شود.
- میکروب هایی که داخل بدن وجود دارند.
- میکروب های موجود در هوا
- دست های آلوده جراح و تیم جراحی
- ابزار جراحی آلوده

چه کسانی بیشتر در معرض عفونت زخم جراحی قرار دارند ؟

- افرادی که دارای دیابت کنترل نشده باشند.
- افرادی که دارای سیستم ایمنی ضعیف باشند.
- افرادی که بیماری مربوط به سیستم ایمنی بدن داشته باشند.
- افرادی که دچار اضافه وزن هستند.
- افرادی که سیگار می کشند.
- از کورتیکواستروئیدهایی چون پردنیزون (نوعی دارو) استفاده می کنند.
- افرادی که جراحی آن ها چیزی بیشتر از دو ساعت طول می کشد.

عفونت زخم جراحی در سطوح مختلف ایجاد می شود که در زیر به آن ها اشاره می کنیم:

روی زخم جراحی سطحی: عفونت تنها در ناحیه ی پوستی اتفاق می افتد.
زخم جراحی عمیق: عفونت به نواحی عمیق تر پوست راه پیدا می کند و به ماهیچه و بافت بدن می رسد.

زخم های جراحی اندامی: عفونت زخم جراحی بسیار عمیق می شود و اندامی که جراحی در آن انجام شده را درگیر می کند.



در بسیاری از موارد عفونت های زخم جراحی در ۳۰ روز اول بعد از جراحی به وجود می آید.

عفونت زخم جراحی چیست ؟

درمان عفونت زخم جراحی

برای درمان عفونت زخم جراحی، آنتی بیوتیک استفاده می شود. در بعضی موارد، برای درمان عفونت زخم جراحی، نیاز به جراحی دیگری است.

آنتی بیوتیک ها در درمان زخم جراحی

در اکثر موارد درمان عفونت زخم جراحی، با درمان آنتی بیوتیک ها شروع می شود. مدت زمان مصرف آنتی بیوتیک و دوره ی مصرف آن، برای هر فردی متفاوت است و پزشک تعیین می کند. حداقل دره ی مصرف آنتی بیوتیک برای عفونت زخم جراحی، یک هفته است. انواع آنتی بیوتیک ها برای درمان زخم عفونت جراحی شامل موارد زیر می باشد:

1. آنتی بیوتیک وریدی (که معمولا درمان با این آغاز می شود)
2. قرص های آنتی بیوتیک (برای تکمیل درمان استفاده می شود)

نکته: یک دوره ی مصرف آنتی بیوتیک حتما باید کامل شود، حتی اگر در میانه ی دوره ی ۷ روزه احساس بهتری داشته باشید.

گاهی نیاز است که برای تشخیص درست نوع آنتی بیوتیکی که باید تجویز شود، ترشح عفونی زخم، مورد آزمایش قرار گیرد.

بعضی از زخم های جراحی با استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (نوعی باکتری بی هوازی) یا MRSA آلوده می شوند که به بیشتر آنتی بیوتیک های مورد استفاده در درمان عفونت زخم جراحی مقاوم است. درمان عفونت زخم جراحی ناشی از MRSA با نوع خاصی از آنتی بیوتیک ها انجام می شود.

جراحی مجدد برای درمان عفونت زخم جراحی

در برخی موارد، برای درمان عفونت زخم جراحی، باید یک عمل جراحی دیگری انجام گیرد. این جراحی به عنوان راهی برای درمان عفونت زخم جراحی، انجام می گیرد. در این جراحی برای درمان عفونت زخم جراحی اقدامات زیر انجام می گیرند:

1. باز کردن زخم جراحی با استفاده از چاقوی کوچک جراحی
2. انجام تست هایی بر روی پوست و بافت زخم جراحی به منظور بررسی وجود عفونت و تعیین نوع آنتی بیوتیک مناسب برای درمان عفونت زخم جراحی
3. تخلیه زخم با برداشت بافت عفونی یا مرده در زخم
4. شستشوی زخم جراحی با آب نمک (محلول سالین)
5. تخلیه کیسه چرک زخم جراحی
6. بستن زخم با پانسمانهای نوین
7. مراقبت از زخم جراحی

چه زمان باید به متخصص بیماری های عفونی مراجعه کرد؟

در صورتی که متوجه علائم عفونت زخم جراحی در محل جراحی خود شدید به متخصص عفونی مراجعه کنید. علائم عفونت زخم جراحی عبارتند از:

- چرک کردن یا ترشح
- بوی بد که از زخم جراحی متصاعد می شود
- تب و لرز
- داغ شدن زخم
- قرمزی
- درد یا حساسیت به لمس

یکی از نشانه های عفونت قرمزی است
برای درمان عفونت زخم جراحی،
آنتی بیوتیک استفاده می شود.

